

10. BIBLIOGRAFIA CITATA E DI RIFERIMENTO

- AA.VV., 1957. *Conosci l'Italia. Volume 1 "L'Italia Fisica"*. Touring Club, Milano.
- AA.VV., 1984. *Pineta: ecosistema della Pineta di Tradate ed Appiano Gentile*. A cura del Rotary Club Tradate, Federico Motta editore, Milano.
- AA.VV., 1990. *Alpi e Prealpi Lombarde*. Società Geologica Italiana, BE-MA editrice.
- AA.VV., 1995a. *Southern Alps Quaternary Geology, International Geological Correlation, Programme of UNESCO, IGCP 378, Circumalpine Quaternary Correlation*. Abstracts dal Meeting organizzato dal Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano e dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano, Lugano 2-6 ottobre 1995.
- AA.VV., 1995b. *Mammiferi della Svizzera*. Memorie dell'Accademia Svizzera di Scienze naturali, Volume 103, Basel (Schweiz).
- AA.VV., 2000a. *Piano Faunistico-Venatorio della Regione Lombardia*. Regione Lombardia, Assessorato all'Agricoltura; Università degli Studi dell'Insubria; Università degli Studi di Milano Bicocca; Università degli Studi di Pavia.
- AA.VV., 2000b. *Progetto SIT-FAUNA*. Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese. Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale. Unità di Analisi e Gestione delle Biocenosi. Provincia di Varese. Settore Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica.
- Abram S., Menegon M., 1994. *Vipere e altri serpenti italiani*. Siste Ed., Trento: pp. 176.
- Adkins C. A., Stott P., 1998. *Home ranges, movements and habitat associations of red foxes *Vulpes vulpes* in suburban Toronto, Ontario, Canada*. J. Zool. Lond., 244: 335-346.
- Adornato L., 1999. *Analisi funzionale delle relazioni specie-habitat per alcuni Carnivori in provincia di Varese*. Tesi di Laurea in Scienze Biologiche. Università degli Studi dell'Insubria.
- Alberti P., Carabella M., Colaone S., Danini G., Saporetti F., Scandolara C., 2001. *L'avifauna nidificante nelle brughiere della Lombardia occidentale*. Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Associazione Fauna Viva. Ricerca Ornitologica in Italia settentrionale: tra associazioni e istituzioni.
- Allen H., 1989. *On the taxonomic values of the wing membranes and of the terminal phalanges of the digits in the Chiroptera*. Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia: 313-340.
- Altringham J. D., 1996. *Bats. Biology and Behaviour*. Oxford University Press Inc., New York.
- Altringham J. D., Park K. J., 1996. *Why do bats emerge from roosts in clusters?* In preparation.
- Amann T., Rykena S., Joger U., Nettmann H. K., Veith M., 1997. *Zur artlichen Trennung von *Lacerta bilineata* (Daudin, 1802) und *L. viridis* (Laurenti, 1768)*. Salamandra, 33(4): 255-268.
- Amori G., Angelici F. M., 1999. *Mammals of Italy: a revised checklist of species and subspecies*. Mammalia, 79(2): 271-286.
- Ancona N., Capietti A., 1995. *Analysis of the breeding site characteristics of amphibians in a pre-alpine area (Triangolo Lariano)*. In: Llorente G. A., Montori A., Santos X., Carretero M. A. (eds.), Scientia Herpetologica. Asociación Herpetológica Española, Barcelona: 160-164.
- Andersen R., Duncan P., Linnell J. D. C., 1998. *European Roe Deer: The Biology of Success*. Scandinavian University Press.
- Andreis C., Cerabolini B., 1990. *Indagine floristico-vegetazionale finalizzata alla stesura del Piano di gestione*. Consorzio parco Brughiera Briantea. Inedito.
- Andreis C., Cerabolini B., 1993. *La Brughiera Briantea: la vegetazione ed il piano di gestione*. Colloques phytosociologiques, XII Ecologia del paesaggio, Camerino.
- Andreone F., Fortina R., Chiminello A., 1993. *Natural history, ecology and conservation of the Italian spadefoot toad, *Pelobates fuscus insubricus**. (*Storia naturale, ecologia e conservazione del*

-
- pelobate insubrico*, *Pelobates fuscus insubricus*). Scientific Reports n. 2. Zoological Society "La Torbiera", Agrate Conturbia (Novara): 1-93.
- Angelstam P., Mikusinski G., 1994.** *Woodpecker assemblages in natural and managed boreal and hemiboreal forest: a review*. *Annales Zoologici Fennici*, 31: 157-172.
- Anonimo, 1997.** *Linee guida per la prevenzione del rischio sanitario legato alle immissioni di fauna selvatica sul territorio nazionale*. In: Spagnesi M., Guberti V., De Marco M. A. (eds.), *Atti del Convegno Nazionale: Ecopatologia della Fauna Selvatica*, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXIV: 715-720.
- Aragòn S., Braza F., San Jose C., 1995.** *Socioeconomic, physionomic, and climate factors determining the distribution pattern of roe deer *Capreolus capreolus* in Spain*. *Acta Theriologica*, 40: 37-43.
- Armitage P., 1971.** *Statistica medica. Metodi statistici per la ricerca in medicina*. Feltrinelli editore, Milano: pp. 493.
- Aronoff S., 1991.** *Geographic information systems: a mangement perspective*. WDL Publications, Ottawa.
- Aronsson S., Stenson J. A. E., 1995.** *Newt-fish interactions in a small forest lake*. *Amphibia-Reptilia*, 16: 177-184.
- Avoleo L., 1996.** *Proposta di metodologia di analisi per interventi di ingegneria naturalistica: studio geomorfologico – ambientale e progettazione nel Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate*. Tesi di Laurea in Scienze Naturali. Università di Milano.
- Baker S., 1999.** *Eradication of *Myocastor coypus* in United Kingdom*. In: Workshop on the control and eradication of non-native terrestrial vertebrates, Council of Europe Publishing, Enviromental encounters, 40: 83-87.
- Balletto E., Giacoma C., 1993.** *Stochastic extinction probability for European populations of *Hyla arborea*: an approach by VORTEX*. In: Stumpel A. H. P. & Tester U. (eds.), *Ecology and conservation of the European Tree Frog*: 81-90.
- Baratti N., Debernardi P., Patriarca E., 1990.** *Ruolo delle cassette artificiali per lo studio e la conservazione dei Chiroterri*. *Picus*, 16: 55-61.
- Barbieri F., 1992.** *Gli anfibi dell'Appennino settentrionale: problematiche di salvaguardia*. Quaderni della Civica Stazione Idrobiologica di Milano, 19: 47-51.
- Barbour K. E., Davis W. H., 1969.** *Bats of America*. University Press of Kentucky, Lexington.
- Barlow K. E., Jones G., Barratt E. M., 1997.** *Can skull morphology be used to predict ecological relationship between bat species? A test using two cryptic species of pipistrelle*. *Proc. Roy. Soc. Lond. B.*, 264: 1695-1700.
- Barrai I., 1984.** *Metodi di regressione e classificazione in biometria*. Edagricole. Bologna.
- Barratt E. M., Deaville R., Burland T. M., Bruford M. W., Jones G., Racey P. A., Wayne R. K., 1997.** *DNA answers the call of pipistrelle bat species*. *Nature*, Lond., 387: 138-139.
- Bassano B., Boano G., Meneguz P. G., Mussa P. P., Rossi L., 1995.** *I selvatici delle Alpi Piemontesi*. Eda Regione Piemonte.
- Beebee T. J. C., 1996.** *Ecology and conservation of Amphibians*. Chapman & Hall, London.
- Beltran J. F., Delibes M., Rau J. R., 1991.** *Metodi di censimento della volpe*. *Histrix*, 3: 199-214.
- Bennati R., Bonetti M., Lavazza A., Gelmetti D., 1994.** *Skin lesions associated with herpesvirus-like particles in frogs (*Rana dalmatina*)*. *Veterinary Record*, 135: 625-626.
- Bernini F., Barbieri F., Vercesi A., 2000.** *Nuove metodologie di cattura e di marcatura negli anuri: prima esperienza su *Rana latastei* e *Rana dalmatina**. In: C. Giacoma (Editor), *Atti del I Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica*. Mus. reg. Sci. nat. Torino, Torino, 1996: 269-276.
- Bertolino S., Currado I., Mazzoglio P. J., Pallavicino L., 1998.** *L'uso degli hair-tubes nel monitoraggio di roditori arboricoli*. II Congr. Italiano Teriologia, Varese. Abstract: 172.
-

- Bertolino S., Currado I., Mazzoglio P. J., Amori G., 2000.** *Native and alien squirrels in Italy.* *Hystrix Italian Journal of Mammology*, 11: 65-74.
- Biallo G., Gargano O., 1997.** *I metadati; lo strumento per descrivere le informazioni geografiche.* *Mondo GIS*, 2(5): 9-16.
- Bibby C. J., Burgess N. D., Hill D. A., 1992.** *Bird Census Techniques.* Academic Press.
- Blanchard F. N., Finster E. B., 1933.** *A method of marking living snakes for future recognition, with a discussion of some problems and results.* *Ecology*, 14(4): 334-347.
- Blondel J., Ferry C., Frochot B., 1970.** *La méthode des indices ponctuels d'abondance (IPA) ou des relevés d'avifaune par stations d'écoute.* *Alauda*, 38 : 55-71.
- Boisauvert B., Maillard D., Maire M. H., 1985.** *Etude du regime alimentaire du Chevreuil en foret de Haye.* *Proceeding XVIIth Congress Game Biology*: 421-429.
- Bonini L., Gentili A., Razzetti E., Scali S., 2000.** *Progetto atlante erpetologico lombardo: cartine definitive (27 maggio 2000).* *Societas Herpetologica Italica Sezione Lombardia, Centro Stampa dell'Università di Pavia.*
- Borrini E., De Polo M., 1985.** *Il canale scolmatore delle piene a Nord Ovest di Milano nel sistema drenante ed irriguo della Provincia di Milano.* *Provincia di Milano, Milano.*
- Bovio G., Camia A., Marchisio R., 1995.** *I boschi del Savonese.* *Provincia di Savona.*
- Bradbury J. W., 1977.** *Social organisation and communication.* In Wimsatt W. A., ed., *Biology of bats*, vol. 3, Academic Press, New York: 1-72.
- Braña F., 1991.** *Summer activity patterns and thermoregulation in the wall lizard, Podarcis muralis.* *Herpetological Journal*, 1: 544-549.
- Braña F., Frechilla L., Orizaola G., 1996.** *Effect of introduced fish on amphibian assemblages in mountain lakes of northern Spain.* *Herpetological Journal*, 6: 145-148.
- Bressi N., 1998.** *Habitat fragmentation, metapopulation dynamics and declining amphibian populations: a field study of green frogs, Rana (Pelophylax) synklepton esculenta Linné, 1758.* In: Miaud C. & Guyétant G. (eds.), *Current studies in herpetology.* SEH, Le Bourget du Lac, France: 71-78.
- Bressi N., Dolce S., 1992.** *Primi dati sulla situazione e la salvaguardia degli anfibi in provincia di Trieste.* *Quaderni della Civica Stazione Idrobiologica di Milano*, 19: 93-100.
- Brichetti P., Fasola M. (red.), 1990.** *Atlante degli Uccelli Nidificanti in Lombardia.* Editoriale Ramperto.
- Bridges C. M., 1999.** *Effects of a pesticide on tadpole activity and predator avoidance behavior.* *Journal of Herpetology*, 33(2): 303-306.
- Brigham R. M., Cebek J. E., Hickey M. B. C., 1989.** *Intraspecific variation in the echolocation calls of two species of insectivorous bats.* *J. Mamm.*, 70(2): 426-428.
- Brooke A. P., 1994.** *Diet of the fishing bats, Noctilio leporinus (Chiroptera: Noctilionidae).* *J. Mamm.*, 75: 212-218.
- Brosset A., 1982.** *Structure sociale de chiroptere Hipposideros beatus.* *Mammalia*, 46: 3-9.
- Brown J., Flinders I., Richardson P. W., 1983.** *The use of church porches by bats.* *J. Zool., Lond.*, 200(2): 292-295.
- Brown P., 1976.** *Vocal communication in pallid bat, Antrozous pallidus.* *Z. Tierpsychol.*, 41: 34-54.
- Bruinderink G., Hazebroek E., 1996.** *Ungulate traffic collisions in Europe.* *Conservation Biology*, 10: 1059-1067.
- Bruno S., Maugeri S., 1986.** *Tartarughe e Sauri d'Italia. "I tesori della natura".* Giunti-Martello, Firenze: 1-260.
- Bruno S., Maugeri S., 1990.** *Serpenti d'Italia e d'Europa.* *Guide di Airone.* Editoriale Giorgio Mondadori, Rozzano (MI): 1-223.

-
- Bulgarini F., Calvario E., Fraticelli F., Petretti F., Sarrocco S. (eds.), 1998.** *Libro rosso degli animali d'Italia. Vertebrati.* WWF Italia, Roma.
- Burgess N. D., Evans C. E., Sorensen J., 1989.** *The management of heathland for nightjars at Minsmere, Suffolk.* Management Case Study, RSPB, Sandy, U.K.
- Burnham K. P., Overton W. S., 1978.** *Estimation of the size of a closed population when capture probabilities vary among animals.* Biometrika, 65: 625-633.
- Burnham K. P., Overton W. S., 1979.** *Robust estimation of population size when capture probabilities vary among animals.* Ecology, 60: 927-936.
- Caiani A., 2000.** *Ecologia trofica dei carnivori del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.* Tesi di laurea in Scienze Naturali. Università degli Studi di Milano.
- Caldonazzi M., Zanghellini S., 2000.** *Una trappola galleggiante per tritoni e larve di anfibi.* In: C. Giacomina (ed.), Atti del I Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica. Mus. reg. Sci. nat. Torino, Torino, 1996: 265-267.
- Campbell H. W., Christman S. P., 1982.** *Field techniques for herpetofaunal community analysis.* In: Scott N. J. J. (ed.), Herpetological communities. United States Department of the Interior, Washington D.C.: 193-217.
- Camussi A., Möller F., Ottaviano E., Sari Gorla M., 1986.** *Metodi statistici di sperimentazione biologica.* Zanichelli. Bologna.
- Capizzi D., Luiselli L., Capula M., Rugiero L., 1995.** *Feeding habits of a Mediterranean community of snakes in relation to prey availability.* Rev. Ecol. (Terre Vie), Paris, 50: 353-363.
- Capula M., Luiselli L., 1990.** *Contributo allo studio della microteriofauna di un'area dell'Italia centrale (Monti della Tolfa, Lazio) mediante analisi del contenuto stomacale di Vipera aspis (Reptilia, Viperidae).* Hystrix, 2: 101-107.
- Capula M., Luiselli L., Anibaldi C., 1996.** *Ecologia dell'orbettino (Anguis fragilis) in ambiente alpino.* Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica, 71(1994): 173-175.
- Capula M., Filippi E., Luiselli L., Trujillo Jesus V., 1997.** *The ecology of the Western Whip Snake, Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789) in Mediterranean Central Italy.* Herpetozoa, 10(1/2): 65-79.
- Carretero M. A., Llorente G. A., De Roa E., 1992.** *Un nuevo modelo de trampa para la captura de larvas de anfibios.* Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 3: 26-27.
- Casati P., Pace F., 1991.** *Scienze della Terra – L'atmosfera, l'acqua, i climi, i suoli.* CLUP, Milano.
- Castroviejo J., 1974.** *Natrix natrix comiendo Discoglossus pictus.* Doñana, Acta Vertebrata, 1: 58.
- Chapman J. A., Hockman J. G., Edwards W. R., 1982.** *Cottontails.* In: Chapman J. A., Feldhamer G. A. (eds.), Wild Mammals of North America: Biology, Management and Economics, The Johns Hopkins University Press, Baltimore: 83-123.
- Chapuis J., Forgeard F., Didillon M. C., 1985.** *Etude de sylvilagus floridanus en region mediterraneenne dans des conditions de semi-liberte. Regime alimentaire au cours d'un cycle annuel par l'analyse mycographique des feces.* Gibier Faune Sauvage, 3: 5-31.
- Cecchi A., 1999.** *Interventi ambientali e strutture ingegneristiche per la prevenzione di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica.* Risorsa Fauna 5, Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, Provincia di Bologna.
- Chemini C., Rizzoli A., Merler S., Furlanello C., Genchi C., 1997.** *Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) infestation on roe deer (Capreolus capreolus) in Trentino, Italian Alps.* Parassitologia, 39: 59-63.
- Cheyland M., 1986.** *Mise en évidence d'une activité nocturne chez le Serpent méditerranéen Elaphe scalaris (Ophidia, Colubridae).* Amphibia-Reptilia, 7: 181-186.
- Cocchi R., Toso S., Trocchi V., 1992.** *Principi ecologici e metodologie operative per il ripristino ambientale di ecosistemi agrari a fini faunistici.* Posters 20, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Bologna.
- Cogliati M., Meozzi D., 1991.** *I posatoi dei Succiacapre Caprimulgus europaeus.* Atti V Convegno italiano di Ornitologia. Suppl. Ric. Biol. Selv. (S.R.O. P. U. red).
-

- Colaone S., Pinoli G., 1999.** *Nidificazione di Astore, Accipiter gentilis, nel Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (Province di Como e Varese, Lombardia).* Riv. ital. Ornit., 69: 221-223.
- Corneli H. V., Lawton J. H., 1992.** *Species interactions, local and regional processes, and limit to the richness of ecological communities: a theoretical perspective.* Journal of Animal Ecology, 61: 1-12.
- Cortellessa C. M., 1994.** *Breve introduzione ai Sistemi Informativi Geografici.* Franco Ziviani Editore. Milano.
- Cox P. A., 1983.** *Observations of the natural history of Samoan bats.* Mammalia, 47: 519-523.
- Cramp S. (eds.), 1985.** *The Birds of the Western Palearctic, Vol. IV.* Oxford University Press.
- Cramp S., Perrins C. M. (eds.), 1993.** *The Birds of the Western Palearctic. Vol. VII.* Oxford University Press.
- Crucitti P., 1996.** *Ecologia ed etologia dei pipistrelli. Problemi e metodi di studio.* Natura e montagna.
- Currado I., Scaramazzino P. L., 1989.** *Modificazioni ambientali e danni da roditori arboricoli in Piemonte.* In: Atti IV Convegno Nazionale Associazione "Alessandro Ghigi": 255-258.
- Currado I., Scaramazzino P. L., Brusino G., 1987.** *Note sulla presenza dello Scoiattolo grigio (Sciurus caroliniensis Gmeil, 1788) in Piemonte (Rodentia: Sciuride).* Ann. Fac. Sci. Agr. Univ. Torino, 14: 307-331.
- Dagnall J., Duckett J. G., Gurnell J., 1995.** *A simple negative staining technique for the identification of mammal hairs.* J. Zool., Lond., 237: 670-675.
- De Jong C. B., Gill R. M. A., Van Wieren S. E., Burlton F. W. E., 1995.** *Diet selection by roe deer in Kielder Forest in relation to plant cover.* Forest Ecology and Management, 79: 91-97.
- Dell'Acqua F., 1997.** *Studio di una popolazione di scoiattolo (Sciurus vulgaris L. 1758) nel Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, con stima della densità di popolazione.* Tesi di Laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di Milano: pp. 75.
- Deruaz D., Eid P., Deruaz J., Sempere A., Bourgouin C., Rodhain F., Perez-Eid C., 1996.** *Use of enzyme-labelled protein G-assay for the detection of anti Borrelia burgdorferi antibodies in wild animal sera.* European Journal of Epidemiology, 12: 515-519.
- Desio A., Villa F., 1960.** *Stratigrafia dei pozzi per acqua della pianura padana. 1 - Lombardia, Milano.*
- Dolce S., 1983.** *Osservazioni eco-etologiche su Natrix natrix (L.) negli stagni del Carso triestino (Italia nordorientale) (Reptilia, Squamata, Colubridae).* Atti Museo civico Storia naturale Trieste, 35: 313-328.
- Donzelli P., 1986.** *Storia dei tre torrenti Bozzente, Gradaluso, Fontanile dall'anno 1500 fino all'epoca della loro separazione del 1762 ai nostri giorni.* Cislago.
- Duchaufour P., 1965.** *Precis de Pedologie.* 2 ediz. Masson et C.ie, Parigi.
- Edenhamn P., Salonen A. C., 1996.** *The colonization of the European tree frog (Hyla arborea L.) in a landscape mosaic.* In: Edenhamn P. (ed.), Spatial dynamics of the European tree frog (Hyla arborea L.) in a heterogeneous landscape. Swedish University of Agricultural Sciences, Dep. Wildlife Ecol., Uppsala: 65-87.
- Eichenberger W., 1983.** *Elementi di meteorologia.* Mursia, Milano.
- Entwistle A. C., Racey P. A., Speakman J. R., 1998.** *The reproductive cycle and determination of sexual maturity in male brown long eared bats, Plecotus auritus (Chiroptera: Vespertilionidae).* J. Zool. Lond., 244: 63-70.
- ERSAL, 1988.** *I suoli del parco Pineta di Appiano Gentile – Tradate e aree limitrofe.* Milano.
- ESRI - Environmental Systems Research Institute, Inc., 1994a.** *ARC/INFO User Manual, Version 7.2.1.* ESRI, Redlands, CA.

-
- ESRI - Environmental Systems Research Institute, Inc., 1994b.** *Using ArcView GIS 3.0.* ESRI, Redlands, CA.
- ESRI - Environmental Systems Research Institute, Inc., 1996.** *Using ArcView GIS 3.1.* ESRI, Redlands, CA.
- ESRI - Environmental Systems Research Institute, Inc., 1999.** *ARC/INFO User Manual, Version 8.1.* ESRI, Redlands, CA.
- Fabbris L., 1990.** *Analisi esplorativa di dati multidimensionali. Seconda edizione.* CLEUP, Università di Padova.
- Fabbro A., 1994.** *Una associazione di micromammiferi della foresta di Tarvisio (Insectivora, Rodentia).* Gortania - Atti Museo Friul. Storia Nat., 16: 229-246.
- Fenton M. B., 1985.** *Communication in the Chiroptera.* Univ. of Indiana Press, Bloomington.
- Fenton M. B., 1986.** *Design of bat echolocation calls: implications for foraging ecology and communication.* Mammalia, 2: 192-203.
- Fenton M. B., Morris J. K., 1976.** *Opportunistic feeding by deserts bats (Myotis spp.).* Canadian J. Zool., 54(4): 526-530.
- Findley J. S., 1993.** *Bats: a community perspective.* Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- Findley J. S., Black H., 1983.** *Morphological and dietary structuring of a Zambian insectivorous bat community.* Ecology, 64(4): 625-630.
- Foresman K. R., Pearson D. E., 1998.** *Comparison of proposed survey procedures for detection of forest carnivores.* Journal of wildlife management, 62(4): 1217-1226.
- Fornasari L., Bottoni L., Massa R., Fasola M., Brichetti P., Vigorita V. (eds.), 1992.** *Atlante degli Uccelli Svernanti in Lombardia.* Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano.
- Fornasari L., Casale P., Wauters L., 1997.** *Red squirrel conservation: the assessment of a reintroduction experiment.* Ital. J. Zool., 64: 163-167.
- Fornasari L., Violani C., Zava B., 1997.** *I Chiropteri italiani.* Editrice L'Epos, Palermo.
- Fowler J., Cohen L., 1993.** *Statistica per ornitologi e naturalisti.* Franco Muzzio Editore, Padova.
- Gabert P., 1962.** *Les plaines occidentales du Po et leur piedemonts, Piemont, Lombardie occidentale et centrale: etude morphologique.* Ed. Louis Jean. Gap.
- Galeotti P., 1991.** *Metodi di censimento per gli Strigiformi.* Atti II Seminario Italiano Censimenti Faunistici dei Vertebrati: Brescia, 1989. Suppl. Ric. Biol. Selv., vol. XVI, 1991.
- Garson P. J., Lurz P. W. W., 1998.** *Red squirrel monitoring: the potential of hair-tubes for estimating squirrel abundance in conifer plantations dominated by Sitka spruce.* Relazione inedita.
- Garzon J., 1974.** *Natrix natrix capturando Leuciscus, Rana y Bufo bufo.* Doñana, Acta Vertebrata, 1: 58.
- Gatti P., Wauters L., Bianchi C., Carlini E., Piccinini S., Zubiani P., 1997.** *Progetto lepree: rapporto intermedio.* Amm. Prov. di Como, Settore Risorse Ambientali, Servizio Faunistico: pp. 175.
- Gauch H. G. Jr., 1982.** *Multivariate Analysis in Community Ecology.* Cambridge Studies in Ecology. Cambridge University Press.
- Gebhard J., 1991.** *Unsere Fledermause, 3. Aufl.* Naturhistorisches Museum, Basel.
- Genghini M., 1994.** *I miglioramenti ambientali a fini faunistici.* Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 16.
- Genovesi P., Amori G., 1999.** *Conservation of Sciurus vulgaris and eradication of Sciurus carolinensis in Italy.* In: Workshop on the control and eradication of non-native terrestrial vertebrates, Council of Europe Publishing, Environmental encounters, 40: 101-106.
- Genovesi P., Bertolino S., 2001.** *Linee guida per il controllo dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) in Italia.* Quad. Cons. Natura, 4. Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica: pp 52.
-

- Gentili A., Scali S., 1999.** *Analisi della diversità erpetologica in Pianura Padana.* Atti 2° Congresso Nazionale S.H.I., 6-10/10/1998 Praia a Mare (CS), Riv. Idrobiol., 38, 1/2/3: 113-122.
- Gentili A., Scali S., Zuffi M., 1996.** *Conferma della presenza di Pelobates fuscus insubricus Cornalia, 1873 in provincia di Varese (Amphibia Anura Pelobatidae).* Natura Bresciana, Annali del Museo Civico di Storia Naturale, Brescia, 30(1994): 259-262.
- Gentili A., Scali S., Barbieri F., Bernini F., 2001.** *A three years project for the management and the conservation of Amphibians in Northern Italy.* Abstracts of the oral and poster presentations of the 11th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica (SHE), Zalec, Slovenia, July 13-17, 2001, Biota, 2(Suppl.): 22.
- Giani T., Ziglioli R., 1979.** *La Pineta di Appiano – Tradate, realtà e prospettive.* Tesi di Laurea in Architettura, Politecnico. Milano.
- Giardini L., 1986.** *Agrografia generale.* Patron editore. Bologna.
- Gill R. M. A., 1994.** *The population dynamics of roe deer (Capreolus capreolus L.) in relation to forest habitat succession.* Ph.D. thesis, The Open University: pp. 191.
- Gioia M., 2001.** *Dinamica di popolazione e organizzazione sociale dello scoiattolo europeo in un habitat eterogeneo dell'alta pianura lombarda.* Tesi di Laurea in Scienze Naturali. Milano.
- Golay N., Durrer H., 1994.** *Inflammation due to toe-clipping in natterjack toads (Bufo calamita).* Amphibia-Reptilia, 15: 81-96.
- Golubic D., Rijpkema S., Kvakan I., Rezek T., Skvorc V., Ruzic E., 1995.** *Serological evidence for Lyme borreliosis in northwest Croatia.* Veterinarski Arhiv., 65: 127-133.
- Gomasasca M., 1997.** *Introduzione a telerilevamento e GIS per la gestione delle risorse agricole e ambientali.* Arte Stampa, Daverio (VA).
- Graf M., Stutz H. P. B., Ziswiler V., 1992.** *Regionale und saisonale unterschiede in der nahrungszusammensetzung des grossen mausohrs Myotis myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) in der Schweiz.* Z. Säugetierk., 57(4): 193-200.
- Griffiths R. A., 1995.** *Newts and salamanders of Europe.* T. & A. D. Poyser, London.
- Grimaldi E., Manzoni P., 1990.** *Enciclopedia illustrata delle specie ittiche d'acqua dolce di interesse commerciale e sportivo in Italia.* Istituto Geografico De Agostini, Novara: 1-142.
- Grimaldi E., Puzzi C. M., Trasforini S., Gentili G., Monicelli F., Romanò A., Sartorelli M., Catelli C., Bosi R., Barengi B., 1999.** *Ricerca sulla fauna ittica del Fiume Ticino.* Parco Ticino, Castalia, Recco (GE): 1-60.
- Groombridge B., 1994.** *The 1994 IUCN Red List of Threatened animals.* IUCN, Gland, Switzerland.
- Guèdon G., Bèlair M., Pascal M., 1990.** *Comparison l'efficacité de cinq pièges non vulnèrant de la capture du Campagnol provençal (Pitymys duodecimcostatus de Sèlys-longchamps, 1839).* Mammalia, 54(1): 137-145.
- Guima, 1971.** *Il capriolo.* La caccia nel Ticino, 2(8): 13-14.
- Gulino G., Dal Piaz G., 1939.** *I Chiroterri italiani. Elenco delle specie con annotazioni sulla loro distribuzione geografica e frequenza nella penisola.* Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino, XLVII (III), 91: 61-103.
- Gurnell J., Pepper H., 1994.** *Red squirrel conservation: field study methods.* Research Information Note n. 255. Forestry Commission, Farnham: pp. 9.
- Hailey A., Davies, P. M. C., 1985.** *"Fingerprinting" snakes: a digital system applied to a population of Natix maura.* J. Zool. Lond. (A), 207: 191-199.
- Hall R. J., Henry P. F. P., 1992.** *Assessing effects of pesticides on amphibians and reptiles: status and needs.* Herpetological Journal, 2: 65-71.
- Handley C. O., 1968.** *Capturing bats with mistnets.* In: Bats and bat banding (A. M. Greenhall, J. L. Paradiso): 15-19. Bureau Sports Fisheries Wildl., Res. Publ.72, Washington D.C.

-
- Harmata W., 1985.** *The length of awakening time from hibernation of three species of bats.* Acta Theriologica, 30(20): 321-323.
- Henseler H. D., 1996.** "Duftzaun" geurafsluiter. Project Reewildcommissie KSHCB Provincie Antwerpen. Intern rapport.
- Herbes R. G., Verbeek-De-Kruif N., Rijpkema S. G. T., Schellekens J. F. P., 1995.** *Onderzoek naar de aanwezigheid van Borrelia burgdorferi in reeën en teken in drie gebieden in Nederland.* Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 120: 722-725.
- Herlant M., 1953.** *Etude comparative sur l'activité génitale des Chéiroptères.* Ann. Soc. Roy. Zool. Belg., 84: 87-116.
- Heyer W. R., Donnelly M. A., McDiarmid R. W., Hayek L. A. C., Foster M. S., 1994.** *Measuring and monitoring biological diversity. Standard methods for Amphibians.* Smithsonian Institution, U.S.A.: 1-364.
- Hone J., 1994.** *Analysis of Vertebrate Pest Control.* Cambridge University Press, Cambridge.
- Horacek I., Hanak V., 1986.** *Generic status of Pipistrellus savii and comments on classification of the genus Pipistrellus (Chiroptera: Vespertilionidae).* Myotis, 23-24: 9-16.
- Hosey G. R., 1981.** *Annual foods of the roe deer (Capreolus capreolus) in the south of England.* Journal of Zoology, London, 42: 276-278.
- Hudson S., 1996.** *Natural toe loss in Southeastern Australian skinks: implications for marking lizards by toe-clipping.* Journal of Herpetology, 30(1): 106-110.
- Hughes B., 1999.** *The Status of the Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis) in the Western Palearctic and an action plan for eradication, 199-2002.* In: Workshop on the control and eradication of non-native terrestrial vertebrates, Council of Europe Publishing, Environmental encounters, 40: 93-100.
- Hughes B., Criado J., Delany S., Galoo-Orsi U., Green A., Grussu M., Perennou C., Torres J., 2000.** *The Status of the North America Ruddy Duck Oxyura jamaicensis in the Western Palearctic: towards an action plan for eradication.* TWSG News, 12: 26-33.
- Ildos A. S., Ancona N., 1994.** *Analysis of amphibian habitat preferences in a farmland area (Po plain, northern Italy).* Amphibia-Reptilia, 15: 307-316.
- Jaenson T. G. T., Talleklint L., 1992.** *Incompetence of roe deer as reservoirs of the Lyme borreliosis spirochete.* Journal of Medical Entomology, 29: 813-817.
- Jarvinen O., Vaisanen R. A., 1975.** *Estimating relative densities of breeding birds by the line transect method.* Oikos, 26: 316-322.
- Johnston J., 1972.** *Econometric Method.* Mc Graw-Hill, London.
- Joly P., Miaud C., 1993.** *How does a newt find its pond? The role of chemical cues in migrating newts (Triturus alpestris).* Ethology Ecology & Evolution, 5: 447-455.
- Jones G., Barratt E. M., 1999.** *Vespertilio pipistrellus Schreber, 1774 and V. pygmaeus Leach, 1825 (currently Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus; Mammalia, Chiroptera): proposed designation of neotypes.* Bull. Zool. Nomencl., 56: 182-186.
- Jongman R. H. G., Ter Braak C. J. F., Van Tongeren O. F. R. (eds.), 1987.** *Data analysis in community and landscape ecology.* Pudoc, Wageningen.
- K.O.F. (Koordinationsstelle Ost für Fledermausschutz für die Zentral-, Ost- und Sudschweiz), 1994.** *Entwurf für eine bestimmungsschlüssel für die Fledermausarten.*
- Kalko E. K. V., 1995.** *Echolocation signal design, foraging habitats and guild structure in six neotropical sheat-tailed bats (Emballonuridae).* In: Ecology, evolution and behaviour of bats, edited by P. A. Racey, S. M. Swift, Symp. Zool. Soc. Lond., 67: 259-273. Oxford University Press, Oxford.
- Kecskés F., Puky M., 1992.** *Spawning preference of the agile frog, Rana dalmatina B.* In: Korsós Z. & Kiss I. (eds.), Proc. Sixth Ord. Gen. Meet. S.E.H, Budapest, 1991: 251-254.
- King C., 1989.** *The natural history of weasels & stoats.* HELM.
-

- Kleiman D. G., 1977.** *Monogamy in mammals*. Q. Rev. Biol., 42: 39-69.
- Koopman K. F., 1970.** *Zoogeography of bats*. In: Slaughter B. H. and Walton D. W. eds., About bats, a chiropteran symposium, Southern Methodist Univ. Press, Dallas: 29-50.
- Koopman K. F., 1993.** *Chiroptera*. In: Wilson D. E. and Reeder D. M. eds., Mammalian species of the world, 2nd ed., Smiths. Inst. Press, Washington D.C.: 137-241.
- Koppen, Geiger, 1930.** *Handbuch der Klimatologie. 5 voll.* Gedrunder Borntrager. Berlino.
- Kunz T. H., 1988.** *Ecological and behavioral methods for the study of bats*. Smithsonian Institution Press, Washington D.C.-London.
- Kusters D., 1995.** *Reewildbeheer in relatie tot bosbouw en bosverjonging*. Thesis Bio-ingenieur in Land- en Bosbeheer, KUL, Leuven: pp. 94.
- Ladiges W., Vogt D., 1986.** *Guida dei Pesci d'acqua dolce d'Europa*. Franco Muzzio & C., Padova: 1-233.
- Lambeck R. J., 1997.** *Focal species: a multi-species umbrella for nature conservation*. Conservation Biology, 11: 849-856.
- Lambert M. R. K., 1997.** *Environmental effects of heavy spillage from a destroyed pesticide store near Hargeisa (Somaliland) assessed during dry season, using reptiles and amphibians as bioindicators*. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 32: 80-93.
- Lamchert F., 1996.** *Effects of toe-clipping on the survival and behaviour of the Australian frog Crinia signifera*. Amphibia-Reptilia, 17: 287-290.
- Lanza B., 1959.** *Fauna d'Italia. Mammalia (Generalità – Insectivora – Chiroptera)*. Edizioni Calderini, Bologna.
- Lanza B., 1983.** *Anfibi e rettili (Amphibia, Reptilia). Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane. 27.* Collana del progetto finalizzato "Promozione dell'ambiente". C.N.R., Roma: 1-196.
- Lanza B., Finotello P. L., 1985.** *Biogeografia dei Chiroterri italiani*. Boll. Mus. Reg. Sc. Nat. Torino, 3(2): 389-420.
- Lecchi A., 1762.** *Piano della separazione dei tre torrenti di Tradate, del Gradaluso e del Bozzente*. In: Raccolta di Autori Italiani che Trattano del Moto delle Acque. Marsigli, 1833. Bologna.
- Legendre L., Legendre P., 1983.** *Numerical Ecology*. Development in Environmental Modeling, 3. Elsevier, Amsterdam.
- Lever C., 1985.** *Naturalized mammals of the World*. Longman, New York: pp. 487.
- Libois R., Waetcher A., 1991.** *La fouine*. Encyclopédie des Carnivores de France. Societe Française pour l'Etude et la Protection des Mammiferes.
- Linnell J. D. C., Andersen R., Duncan P., 1998.** *The European Roe Deer: a portrait of a successful species*. In Andersen R., Duncan P. e Linnell J. D. C. (red.), European Roe Deer: The Biology of Success. Scandinavian University Press.
- LIPU & WWF (a cura di), 1999.** Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., Gallo-Orsi U., Bulgarini F., Fraticelli F. *Nuova Lista Rossa degli Uccelli Nidificanti in Italia*. Riv. ital. Ornit, 69: 3-43.
- Lisconi C., 2001.** *Ecologia e comportamento della cincia dal ciuffo (Parus cristatus) nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate*. Tesi di laurea, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Milano: pp. 162.
- Lorusso L., 1999.** *Ecologia dello scoiattolo europeo (Sciurus vulgaris L.) nei boschi misti del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate*. Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano: pp. 86.
- Lucherini M., Crema G., 1993.** *Diet of the urban stone marten: an example of oecological flexibility*. J. Zool. Lond., 238: 545-555.
- Lucherini M., Lovari S., Crema G., 1995.** *Habitat use and ranging behaviour of the red fox (Vulpes vulpes) in a Mediterranean rural area: is shelter availability a key factor?* J. Zool. Lond., 237: 577-591.

-
- Luiselli L., Agrimi U., 1991.** *Composition and variation of the diet of Vipera aspis francisciredi in relation to age and reproductive stage.* Amphibia-Reptilia, 12: 137-144.
- Luiselli L., Rugiero L., 1990.** *On habitat selection and phenology in six species of snakes in Canale Monterano (Tolfa Mountains, Latium, Italy) including data on reproduction and feeding in Vipera aspis francisciredi (Squamata: Viperidae).* Herpetozoa, 2(3/4): 107-115.
- Luiselli L., Rugiero L., 1991.** *Food niche partitioning by water snakes (genus Natrix) at a freshwater environment in Central Italy.* Journal of Freshwater Ecology, 6(4): 439-444.
- Luiselli L., Capula M., Shine R., 1996.** *Reproductive output, costs of reproduction, and ecology of the smooth snake, Coronella austriaca, in the eastern Italian Alps.* Oecologia, 106: 100-110.
- Luiselli L., Capula M., Shine R., 1997.** *Food habits, growth rates, and reproductive biology of grass snakes, Natrix natrix (Colubridae) in the Italian Alps.* Journal of Zoology of London, 241: 371-380.
- Lurz P. W. W., Rushton S., Wauters L. A., Bertolino S., Currado I., Mazzoglio P. J., Shirley M. D. F. (in stampa).** *Predicting grey squirrel expansion in North Italy: a spatially modelling approach.* Landscape Ecology.
- Lutz M., Zahner M., Stutz H. P., 1986.** *Die gebäudebewohnenden Fledermausarten des Kantons Graubünden.* Jber. Natf. Ges. Graubünden, 103: 91-140.
- Mack R. N., Simberloff D., Lonsdale W. M., Evans H., Clout M., Bazzaz A., 2000.** *Biotic invasive: causes, epidemiology, global consequences, and control.* Ecological Applications, 10(3): 689-710.
- Maddalena T., Moretti M., 1994.** *Identificazione biochimica e morfologica di due specie sorelle: Plecotus auritus e Plecotus austriacus (Chiroptera: Vespertilionidae).* Centro Svizzero di coordinamento per lo studio e la protezione dei pipistrelli e Ufficio Protezione Natura del Canton Ticino-Dipartimento del territorio.
- Madsen T., 1984.** *Movements, home range size and habitat use of radio-tracked Grass snakes (Natrix natrix) in southern Sweden.* Copeia, 3: 707-713.
- Maillard D., Piccard J. F., 1987.** *Autumn and winter diets of roe deer (Capreolus capreolus) in a calcicole beech forest, as determined by rumen content analysis.* Gibier Faune Sauvage, 6: 1-30.
- Malagoli P., Saporito G., Surace G. L., 1997.** *Il Filo d'Arianna: come districarsi nel labirinto delle coordinate.* Mondo GIS, n. 8, Novembre 1997: 21-25.
- Mancini F., 1960.** *Osservazioni sui loess e sui paleosuoli dell'anfiteatro orientale del Garda e di quello di Rivoli.* Atti Soc. It. Sc. Nat., V. 99, N. 3. Milano.
- Manfredi M. T., Scali S., Guidali F. (in stampa).** *Lacerta bilineata (Reptilia Lacertidae) as a host of Ixodes ricinus (Acari Ixodidae).* Parassitologia.
- Marble D. F., 1990.** *Geographic Information Systems: an overview.* In: Pequet D. J. and Marble D. F. (eds.), Introductory readings in Geographic Information systems. Taylor & Francis, London.
- Marchant J., 1996.** *Recording and monitoring of escaped and introduced birds in Britain and Ireland.* In: Holmes J. S., Simons J. R. (eds). The introduction and naturalization of birds, Stationery Office Publications Centre, London: 1-11.
- Marchi P., 1873.** *Sulla morfologia dei peli dei Chiroteri.* Atti Soc. Ital. Sc. Nat., Milano, 15(5): 513-541.
- Marsan A., Spanò S., 1992.** *Il capriolo e il daino in Liguria.* Microart's, Regione Liguria.
- Marshall A. G., 1983.** *Bats, flowers, and fruit: evolutionary relationships in the Old World.* Biol. J. Linnean. Soc., 20: 115-135.
- Martinis B., Robba E., 1978.** *Contributo alla stratigrafia dei depositi quaternari del sottosuolo di Milano.* Riv. It. Paleont. Strat. Vol. 84. Milano.
- Massa R., Fornasari L., Tunesi M., 1988.** *Piano di Settore Fauna. Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.* Università degli Studi di Milano: pp. 175.
-

- Massolo A., Meriggi A., 1995.** *Modelli di valutazione ambientale nella gestione faunistica.* Ecology, Ethology and Evolution (Suppl. n° 1), 7: 2-11.
- Matthysen E., 1997.** *Geographic variation in the occurrence of song type in nuthatch *Sitta europaea* populations.* bis 139: 102-106.
- Mattioli S., 1992.** *Le reintroduzioni di Cervidi in Italia, con particolare riferimento all'Appennino.* Atti del I Cong. Naz. "Paolo Barrasso", "La fauna appenninica e la sua conservazione". Caramanico Terme.
- Matuschka F. R., Heiler M., Eiffert H., Fischer P., Lotter H., Spielman A., 1993.** *Diversionary role of hoofed game in the transmission of Lyme disease spirochetes.* American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 48: 693-699.
- Maywald A., Pott B., 1989.** *Pipistrelli. Vita e protezione.* Ulisse edizioni, Torino.
- Mazzotti S., 1993.** *Competizione fra fauna ittica e batracofauna in laghi dell'Appennino settentrionale.* Quaderni della Civica Stazione Idrobiologica di Milano, 20: 67-74.
- Meja J. S., Weber J. M., 1992.** *Characteristics of breeding dens of the Red fox (*Vulpes vulpes*) in a mountainous habitat.* Z. Saugetierkunde, 57: 137-143.
- Meneguz P. G., Capucci L., Nieddu D., Lavazza A., 2000.** *Role of *Sylvilagus floridanus* in the epidemiology of Rabbit Haemorrhagic Disease and European Brown Hare Syndrome.* In: Atti V Congresso Internazionale European Society for Veterinary Virology: 207-208.
- Meozzi O., Cogliati M., 1985.** *Metodi di censimento del Succiacapre *Caprimulgus europaeus* in ambiente mediterraneo.* Atti III Convegno Italiano di Ornitologia (Fasola, red.).
- Meriggi A., 1990.** *Criteri di analisi e valutazione ambientale: Galliformi e Lagomorfi.* Gestione e Protezione del Patrimonio Faunistico. Atti I e II Corso di Aggiornamento, Brescia: 103-118.
- Merler S., Furlanello C., Chemini C., Nicolini G., 1996.** *Classification tree methods for analysis of mesoscale distribution of *Ixodes ricinus* (Acari: Ixodidae) in Trentino, Italian Alps.* Journal of Medical Entomology, 33: 888-893.
- Mikusinski G., Gromadski M., Chylarecki P., 2001.** *Woodpecker as indicator of Forest Bird Diversity.* Conservation Biology, 15(1): 208-217.
- Milesi S., Crestani C., Barbieri F., 1996.** *Indagini ecoetologiche sull'ululone (*Bombina variegata* variegata L.) nelle Prealpi lombarde.* Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica, 71(1994): 201-204.
- Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Krystufek B., Reijnders J. H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J. B. M., Vohraik V., Zima J. (eds), 1999.** *The atlas of European Mammals.* Academic Press, London.
- Monmonier M. S., 1996.** *How to lie with Maps.* 2nd edition. The University of Chicago Press, Chicago.
- Monney J. C., Luiselli L., Capula M., 1995.** *Notes on the natural history of the smooth snake, *Coronella austriaca*, in the Swiss Alps.* British Herpetological Society Bulletin, 54: 21-27.
- Morrison M. L., Marcot B. G., Mannan R. W., 1992.** *Wildlife – Habitat Relationships. Concepts and Applications.* The University of Wisconsin Press.
- Moser L., 1957.** *Agricoltura e foreste nelle brughiere lombarde.* In: Jacini F., Moser L., Allegri F., Cartiera Vita Mayer C., Perego E., Pepe G., Le brughiere lombarde. Assoc. Forestale Lombarda. CARIPLO. Milano.
- Mussa P. P., Meineri G., Bassano B., 1996.** *Il Silvigalo in Provincia di Torino.* Habitat, 8: 5-11.
- Mustoni A., Wauters L. A., Pinoli G., 1998.** *La reintroduzione del capriolo (*Capreolus capreolus*) nel parco Pineta - Studio di fattibilità e progettazione.* Rapporto tecnico, Parco Pineta: pp. 49.
- Mustoni A., Pedrotti L., Zanon E., Tosi G., 2002.** *Ungulati delle Alpi - riconoscimento biologia e gestione.* Nitida immagine Edizioni (in stampa).
- Mutinelli F., Vernier E., Giuliano S., Tollis M., 1994.** *L'infezione rabida dei pipistrelli in Europa. Monitoraggio delle popolazioni in Italia.* Ambiente risorse e salute: 42-45.

-
- Myers P., 1978.** *Sexual dimorphism in size of Vespertilionid bats.* The American Naturalist, 112: 701-711.
- Nangeroni G., 1929.** *Rilevamento geologico del territorio della provincia di Varese. I. Varese-Malnate-Solbiate.* R. Ist. Tecnico F. Daverio. Varese.
- Nangeroni G., 1967.** *La carta geomorfologica del territorio di Malnate – Tradate. Considerazioni sull'elaborazione di carte geomorfologiche a grande scala.* Atti XV Congr. Geogr. It. Roma.
- Nauelleau G., 1989.** *Etude biotéléométrique des déplacements et de la température chez la couleuvre d'Esculape Elaphe longissima (Squamata, Colubridae) en zone forestière.* Bulletin Société, Herpetologique Française, 52: 45-53.
- Nelson J. E., 1964.** *Vocal communication in Australian flying foxes (Pteropodidae: Megachiroptera).* Z. Tierpsychol., 21: 857-870.
- Neuweiler G., 1984.** *Foraging, echolocation and audition in bats.* Naturwissenschaften, 71: 446-455.
- Niederfriniger O., Rallo G., Violani C., Zava B., 1991.** *Ringed Nathusius' Bats, Pipistrellus nathusii, recovered in N. Italy (Mammalia: Chiroptera).* Atti Soc. It. Sc. Nat. Museo Civ. St. Nat. Milano, 131(19): 281-284.
- Nilsson S. G., 1987.** *Limitation and regulation of population density in the nuthatch Sitta europaea (Aves) breeding in natural cavities.* Journal of Animal Ecology, 56(3): 921-937.
- Nöllert A., Nöllert C., 1995.** *Los anfibios de Europa. Identificación, amenazas, protección.* Ediciones Omega, S.A., Barcelona: 1-399.
- Norberg U. M., Rayner J. M. V., 1987.** *Ecological morphology and flight in bats (Mammalia: Chiroptera): wing adaptation, flight performance, foraging strategy and echolocation.* Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. B., 316: 335-427.
- Novick A., Griffin D. R., 1961.** *Laryngeal mechanisms in bats for the production of sounds.* J. Exp. Zool., 148: 125-145.
- Nowak R. M., 1994.** *Bats of the World.* The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Nyholm, 1959.** *Stoat and weasels and their winter habitats.* In: Biology of mustelids: some soviet research Volume I - Edited by KING - British Library Lending Division, 1975.
- Odum E. P., 1973.** *Principi di ecologia.* Piccin, Padova.
- Oliveira P. J., 1999.** *Habitat restoration on Deserta Grande, Madeira (Portugal): eradication of non-native mammals.* In: Workshop on the control and eradication of non-native terrestrial vertebrates, Council of Europe Publishing, Environmental encounters, 40: 49.
- Orombelli G., 1979.** *Il ceppo dell'Adda: revisione stratigrafica.* Riv. It. Paleont. Strat. Vol. 85. Milano.
- Ott J. A., Scott D. E., 1999.** *Effects of toe-clipping and PIT-tagging on growth and survival in metamorphic Ambystoma opacum.* Journal of Herpetology, 33(2): 344-348.
- Pandolfi R., Santolini R., Bonacoscia M., 1991.** *Censimento notturno di volpe (Vulpes vulpes) e gatto domestico (Felis catus) in tre aree campione delle Marche.* Hystrix, 3: 221-224.
- Pascal M., Chapuis J. L., 1999.** *Eradication of mammals introduced in the island.* In: Workshop on the control and eradication of non-native terrestrial vertebrates, Council of Europe Publishing, Environmental encounters, 40: 31-42.
- Pavignano I., Giacoma C., Castellano S., 1990.** *A multivariate analysis of amphibian habitat determinants in north western Italy.* Amphibia-Reptilia, 11: 311-324.
- Pedrotti L., Mustoni A., 1995.** *Il cervo e il capriolo.* Documenti tecnici. Parco Naturale Adamello Brenta.
- Penck A., Bruckner E., 1909.** *Die Alpen im Eiszeitalter.* 3 Voll. Leipzig.
- Perco F., 1987.** *Ungulati.* Editore Lorenzini, Udine.
- Perco F., 1995.** *Il capriolo.* Editore Lorenzini, Udine.
-

- Perco F., Bellani A., Roveda D., 1996.** *Rapporto sulla situazione del Capriolo nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, in seguito alla reintroduzione iniziata nel 1991.* Relazione tecnica.
- Persicani D., 1989.** *Elementi di Scienza del Suolo.* CEA. Milano.
- Pettigrew J. D., 1986.** *Flying primates? Megabats have the advanced pathway from eye to midbrain.* Science, 231: 1304-1306.
- Piano Territoriale di Coordinamento - Settore Forestale, 1988.** Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.
- Pinna M., 1977.** *Climatologia.* UTET. Torino.
- Pozzi A., 1998.** *Un rarissimo rospetto in provincia di Como.* Natura e Civiltà, 35(9): 162-163.
- Pozzi R., Francani V., 1976.** *Le acque sotterranee della media valle del fiume Olona: problemi idrogeologici ed idrochimici.* CNR Istituto di ricerca sulle acque. Pubbl. 334. Roma.
- Preatoni D., Pedrotti L., 1997.** *I modelli di valutazione ambientale (MVA) come strumento per la pianificazione faunistica.* Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, 27: 97-121.
- Prigioni C., Tacchi F., Armiraglio E., 1991.** *Conteggio delle tane riproduttive di volpe (Vulpes vulpes) in un'area golenale dell'Italia Settentrionale.* Hystrix, 3: 215-220.
- Probert B. L., Litvaitis J. A., 1996.** *Behavioural interactions between invading and endemic Lagomorphs: implicatios for conserving a declining species.* Biological Conservation, 76: 289-295.
- Provincia di Milano, 1985.** *Aspetti idrogeologici dell'Est Milanese e tutela del bacino dell'Idroscalo.* Ass. Ecologia.
- Provincia di Milano, 2000.** *Carta delle vocazioni ittiche. Caratterizzazione ambientale degli ecosistemi acquatici.* Provincia di Milano, Tutela e sviluppo ambientale, U.O. caccia, pesca e Polizia Provinciale, Milano: 1-340.
- Putman R. J., 1997.** *Deer and road traffic accidents - options for management.* Journal of Environmental Management, 51: 43-57.
- Racey P. A., 1969.** *Diagnosis of pregnansy and experimental extention of gestation in the pipistrelle bat, Pipistrellus pipistrellus.* J. Reprod. Fertil., 19: 465-474.
- Racey P. A., 1982.** *Ecology of bats reproduction.* In Kunz T. H., ed., Ecology of bats, Plenum Press, New York: 57-104.
- Racey P. A., Swift S. M., 1981.** *Variation in gestation length in a colony of pipistrelle bats (Pipistrellus pipistrellus) from year to year.* J. Reprod. Fertil., 61: 123-129.
- Ransome R. D., 1990.** *The Natural History of Hibernating Bats.* Christopher Helm Mammal Series, London.
- Ratcliffe P. R., Mayle B. A., 1992.** *Roe deer biology and management.* Forestry Commission Bulletin, 105: 1-28.
- Rayner W. E., Pierson E. D., 1992.** *Distribution of pacific island flying foxes.* In Wilson D. E. and Graham G., eds., Biol. Rept. No. 90, Washington D.C.: 111-121.
- Reading C. J., 1996.** *Predation by grass snakes (Natrix natrix) at a site in southern England.* Journal of Zoology of London, 239: 73-82.
- Reading C. J., Loman J., Madsen T., 1991.** *Breeding pond fidelity in the common toad, Bufo bufo.* Journal of Zoology of London, 225: 201-211.
- Recalcati L., 1980.** *Aspetti ecologici del bosco di Tradate: considerazioni sulle influenze climatiche in rapporto agli incrementi dendrometrici in cinque specie arboree.* Tesi di Laurea in Agraria. Milano.
- Regione Lombardia, Direzione Generale della Presidenza – Servizio Sistema Informativo Regionale, 1996.** *La Cartografia.* Regione Lombardia, Milano.

Regione Lombardia, Direzione Generale della Presidenza – Servizio Sistema Informativo Regionale, 1998. *La Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 (CD-ROM)*. Regione Lombardia, Milano.

Richarz K., Limbrunner A., 1993. *The world of bats*. T.H.F. Publications Inc.

Riga F., 1995. *Uso dello spazio e dell'habitat della volpe *Vulpes vulpes* in ambiente naturale*. Tesi di Dottorato in Biologia Evoluzionistica - Università di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Biologia Animale.

Rijpkema S. G. T., Van Dijk J. E., 1996. *Do roe deer (*Capreolus capreolus*) spread *Borrelia*-infected *Ixodes ricinus* ticks?* *Veterinary Quarterly*, 18, suppl. 3: 146-147.

Rijpkema S. G. T., Herbes R. G., Verbeek-De-Kruif N., Schellekens J. F. P., 1996. *Detection of four species of *Borrelia burgdorferi* sensu lato in *Ixodes ricinus* ticks collected from roe deer (*Capreolus capreolus*) in the Netherlands*. *Epidemiology and Infection*, 117: 563-566.

Riva A., 1957. *Gli anfiteatri morenici a sud del Lario e le pianure diluviali tra Adda e Olona*. Atti dell'Ist. Geol. dell'Univ. di Pavia. Vol. III. Pavia.

Roesli M., Moretti M., 2000. *Chiave per l'identificazione dei pipistrelli della Svizzera*. Centro Protezione Chiroterri Ticino, Dangio.

Rowe J. J., Gill M. A., 1985. *The susceptibility of tree species to bark-stripping damage by grey squirrels (*Sciurus carolinensis*) in England and Wales*. *Quarterly Journal of Forestry*, 79: 183-190.

Rugiero L., Capula M., Luiselli L., 1994. *Scelta dell'habitat di *Coronella austriaca* (Reptilia: Colubridae) in ambiente alpino e sue relazioni con lo stato riproduttivo*. *Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino*, 12(1): 187-200.

Ryberg O., 1947. *Studies on bats and bat parasites especially with regard to Sweden and other neighbouring countries of the North*. Bokforlaget Svensk Natur, Stockholm: XVI, 330.

Ryddel J., Entwistle A., Racey P. A., 1996. *Timing of foraging flights of three species of bats in relation to insect activity and predation risk*. *Copenhagen, Oikos*, 76: 243-252.

Salvioni M., Fossati A., 1993. *I mammiferi del Cantone Ticino*. Lega Svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino.

Santini L., 1983. *I Roditori italiani di interesse agrario e forestale*. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Padova: 1-168.

Saporetti F., 1999. *L'avifauna nidificante in un agroecosistema padano: analisi di un'area campione del Parco Agricolo Sud Milano*. Atti X Convegno Italiano di Ornitologia, Caorle.

Saporetti F., 2001. *L'avifauna nidificante nelle zone umide della Provincia di Varese: status delle specie e grado di conservazione dei biotopi*. *Boll. Soc. Ticinese Sc. nat.*, 89(1-2): 41-50.

Saporetti F., Pavan P., 1990. *Prima nidificazione di *Astore*, *Accipiter gentilis*, in Provincia di Varese*. *Riv. Ital. Ornit.*, 60: 214.

Saporetti F., Guenzani W., Pavan P., 1994. *Densità, habitat e successo riproduttivo dei rapaci diurni nidificanti in un'area prealpina dell'Italia settentrionale*. *Riv. Ital. Ornit.*, 63: 145-173.

Saviozzi P., Zuffi M. A. L., 1997. *An integrated approach to the study of the diet of *Vipera aspis**. *Herpetological Review*, 28(1): 23-24.

Scagliarini A., 1995. *Indagine sierologica in caprioli dell'Appennino Settentrionale*. Tesi di Laurea in Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Bologna: pp. 89.

Scali S., 1993. *Osservazioni su *Rana latastei* e *Triturus vulgaris meridionalis* nel Parco delle Groane (Lombardia, Italia)*. *Quaderni della Civica Stazione Idrobiologica di Milano*, 20: 109-116.

Scali S., 1995. *Amphibians and reptiles of Groane Regional Park (Lombardy, NW Italy). First census and ecological notes*. In: Llorente G. A., Montori A., Santos X., Carretero M. A. (eds.), *Scientia Herpetologica*. Asociación Herpetológica Española, Barcelona: 307-311.

Scali S., Zuffi M., 1994. *Preliminary report on a reptile community ecology in a suburban habitat of northern Italy*. *Bollettino di Zoologia*, 61: 73-76.

- Scali S., Gentilli A., Barbieri F., Bernini F., Vercesi A., 2001.** *Un progetto integrato per la conservazione degli anfibi in Lombardia.* Pianura, Cremona, 13: 100-102.
- Scaramella D., 1984.** *Chiroterri italiani.* Ed. Edagricole, Bologna.
- Scherini G., 1994.** *Piano faunistico venatorio della Provincia di Como.* Provincia di Como.
- Schober W., Grimmberger E., 1997.** *The bats of Europe & North America.* T.F.H. Publications, Inc.
- Scossiroli R. E., 1992.** *Elementi di ecologia.* Zanichelli, Bologna.
- Senna A., 1892.** *I Chiroterri della provincia pavese.* Boll. Scientifico, 13(2-4): 3-27.
- Silvano F., Acquarone C., Cucco M., 2000.** *Distribution of the Easter cottontail Sylvilagus floridanus in the province of Alessandria.* Hystrix, 11: 75-78.
- Snedecor G. W., Cochran W. G., 1989.** *Statistical Methods.* 8th Edition. Iowa State University Press, Ames. Iowa.
- Societas Herpetologica Italica Commissione Conservazione, 1997.** *Linee guida per le reintroduzioni, i ripopolamenti e le introduzioni di Anfibi e Rettili. Herp.Lex.98. La legislazione nazionale e internazionale in materia di conservazione degli Anfibi e Rettili e dei loro habitat: raccolta delle normative riguardanti l'Erpetofauna italiana e fonti di riferimento.*
- Sokal R. R., Rohlf F. J., 1995.** *Biometry: the principles and practice of statistics in biological research (3rd ed.).* W. H. Freeman, New York.
- Spagnesi M., Toso S., 1991.** *I Cervidi: biologia e gestione.* Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina. Documenti Tecnici, 8: 1-82.
- Spagnesi M., Toso S. (eds), 1999.** *Iconografia dei Mammiferi d'Italia.* Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione Natura e Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
- Speakman J. R., 1991.** *The impact of predation by birds on bat population in the British Isles.* Mammal. Rev., 21: 132-142.
- SPSS Inc., 1996.** *SYSTAT 6.0 for Windows.* Graphics. SPSS Inc., Chicago, Ill.
- Stebbing R. E., 1968.** *Measurements, composition and behaviour of a large colony of the bat Pipistrellus pipistrellus.* J. Zool., London, 156: 15-33.
- Stebbing R. E., 1988.** *Conservation of European bats.* Christopher Helm, London.
- Stebbing R. E., 1993.** *Bats.* The Mammal Society.
- Stebbing R. E., Griffith F., 1986.** *Distribution and status of bats in Europe.* Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon.
- Stefanelli A., 1944.** *Considerazioni morfo-ecologiche sull'apparato acustico e statico dei Microchiroterri.* Mem. Classe Sc. Fis. Mat. Nat., 14: 805-814.
- Strahler A. N., 1984.** *Geografia fisica.* Piccin. Pavia.
- Strandgaard H., 1972.** *The roe deer population at Kalo and the factors regulating its size.* Danish Review of Game Biology, 7: 1-205.
- Strelkov P. P., 1969.** *Migratory and stationary bats of the European part of Soviet Union.* Acta Zool. Cracov., 14: 393-439.
- Stumpel A. H. P., Hanekamp G., 1986.** *Habitat and ecology of Hyla arborea in the Netherlands.* In: Rocek Z. (ed.), *Studies in Herpetology*, Prague: 409-412.
- Stutz H. P., Haffner M., 1993.** *Protezione attiva dei pipistrelli. Vol. 1. Direttive per la conservazione e la creazione di biotopi di caccia per pipistrelli.* CEP-Centro di coordinamento est per la protezione dei pipistrelli e FPP-Fondazione per la protezione di pipistrelli indigeni in Svizzera, Museo di Zoologia dell'Università di Zurigo, Zurigo.
- Suga N., 1990.** *Biosonar and neural computation in bats.* Sci. Amer., 262: 34-41.
- Sutherland W. J., Hill D. A., 1995.** *Managing Habitats for Conservation.* Cambridge University Press.

-
- Teerink B. J., 1991.** *Hair of West-European Mammals: atlas and identification key.* Cambridge University Press.
- Telleria J. L., Virgòs E., 1997.** *Distribution of an increasing roe deer population in a fragmented Mediterranean landscape.* *Ecography*, 20: 247-252.
- Tixier H., Duncan P., Scehovic J., Yani A., Gleizes M., Lila M., 1997.** *Food selection by European roe deer (Capreolus capreolus): effects of plant chemistry, and consequences for the nutritional value of their diets.* *Journal of Zoology, London*, 242: 229-245.
- Tomaselli R., Balduzzi A., Filipello S., 1973.** *Carta bioclimatica e della vegetazione forestale attuale e potenziale d'Italia.* Collana Verde n. 33. Min. Agricoltura e Foreste. Roma.
- Tosi G., Toso S., 1992.** *Indicazioni generali per la gestione degli ungulati.* Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Documenti Tecnici, 11: 1-144.
- Toso S., Giovannini A., 1991.** *Proposte per una strategia nazionale di gestione della volpe: le linee direttrici dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.* *Hystrix*, 3: 227-242.
- Toso S., Focardi S., Genovesi P., Petrucco R., 1995.** *Attività di ricerca sull'ecologia del capriolo (Capreolus capreolus) in ambiente appenninico.* Relazione Annuale, INFS.
- Toso S., Tosi G., Duprè E., 1998.** *Linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento di fauna selvatica.* INFS.
- Trizio I., 1999.** *Variazioni stagionali delle densità di piccoli Mammiferi (Rodentia) in relazione ad alcuni microhabitat presenti nell'area prealpina.* Tesi di Laurea in Scienze Biologiche. Università degli Studi dell'Insubria.
- Tucker G. M., Heath M. F., 1994.** *Birds in Europe: their conservation status.* BirdLife international (BirdLife Conservation Series n. 3).
- Tufto J., Andersen R., Linnell J. D. C., 1996.** *Habitat use and ecological correlates of home range size in a small cervid: the roe deer.* *Journal of Animal Ecology*, 65: 715-724.
- Tunner H. G., 1992.** *Locomotory behaviour in water frogs from Neusiedlersee (Austria, Hungary). 15 Km migration of Rana lessonae and its hybridogenetic associate Rana esculenta.* In: Korsós Z. & Kiss I. (eds.), *Proc. Sixth Ord. Gen. Meet. S.E.H, Budapest*, 1991: 449-452.
- Turini F., 1994.** *Micromammiferi dell'oasi faunistica "Orrido di Botri" (Lucca, Toscana) da borre di allocco (Strix aluco L.) e da feci di volpe (Vulpes vulpes L) e di Mustelinae: primi dati.* *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B.*, 101: 101-105.
- Turpinier D., 1981.** *Etude expérimentale des gîtes artificiels pour Chiropteres.* *Myotis*, 18-19: 37-40.
- Tuttle M. D., 1976.** *Collecting techniques.* In: *Biology of the bats of the New World family Phyllostomatidae.* *Spec. Publ. Mus., Texas Tech. Univ., Lubboch, Texas*: 71-88.
- Tuttle M. D., 1979.** *Status, causes of decline, and management of endangered gray bats.* *J. Wildl. Manage.*, 43: 1-1.
- Tuttle M. D., Stevenson D., 1982.** *Growth and survival of bats.* In: *The ecology of bats*, edited by T. H. Kunz. Plenum Press, New York: 105-150.
- Tyler T. J., Liss W. J., Hoffman R. L., Ganio L. M., 1998.** *Experimental analysis of trout effects on survival, growth, and habitat use of two species of ambystomatid salamanders.* *Journal of Herpetology*, 32(3): 345-349.
- Ugolini F., Orombelli G., 1968.** *Notizie preliminari sulle caratteristiche pedologiche dei depositi glaciali e fluvioglaciali fra l'Adda e l'Olona in Lombardia.* *Ist. Lombardo-Acc. di Scienze e Lettere.* Milano.
- Van Gelder J. J., Strijbosch H., 1996.** *Marking amphibians: effects of toe clipping on Bufo bufo (Anura: Bufonidae).* *Amphibia-Reptilia*, 17: 169-174.
- Vehrencamp S. L., Stiles F. G., Bradbury J. W., 1977.** *Observations on the foraging behavior and avian prey of the Neotropical carnivorous bat, Vampyrum spectrum.* *J. Mamm.*, 58: 469- 478.
-

- Veitch C. R., 1995.** *Habitat repair: a necessary prerequisite to traslocation of thretened bird.* In: Serena M. (ed), *Reintroduction biology of Australian and New Zeland fauna*, Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton: 97-104.
- Vernier E., 1993.** *Versatilità nell'utilizzo di strutture umane da parte del pipistrello albolimbato.* Atti della Società Italiana di Scienze Naturali del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 134: 13-16.
- Vigato C., Scali S., Guidali F., 2001.** *Una metodologia per l'individuazione delle metapopolazioni di anfibi.* Pianura, Cremona, 13: 13-15.
- Von Helversen O., 1989.** *Bestimmungsschlüssel für die europaischen Fledermause nach ausseren Merkmalen.* Myotis, 27: 1-60.
- Wauters L. A., 1995.** *Beschermingsplan voor het reewild. Criteria voor een biologisch verantwoord afschotplan voor reewild in Vlaanderen. I.* Wetenschappelijk rapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL.
- Wauters L. A., Dhondt A. A., 1998.** *The use of red squirrel dreys to estimate population density.* J. Zool., Lond., 214: 179-187.
- Wauters L. A., Gurnell J., 1999.** *The mechanism of replacement of red by grey squirrels: a test of the interference competition hypothesis.* Ethology, 105: 1053-1071.
- Wauters L. A., Lens L., 1995.** *Effects of food abundance and density on red squirrel (Sciurus vulgaris) reproduction.* Ecology, 76: 2460-2469.
- Wauters L. A., Currado I., Mazzoglio P. J., Gurnell J., 1997.** *Replacement of red squirrels by introduced grey squirrels in Italy: evidence from a distribution survey.* In *The Conservation of Red Squirrels Sciurus vulgaris L.* (eds. J. Gurnell & P.W.W. Lurz). PTES, London: 79-88.
- Wauters L. A., Piccinini S., Carlini E., Chiarenzi B., Facoetti R., Schillaci M., 1998.** *Progetto lepre: Analisi degli esiti delle immissioni di lepre comune (Lepus europaeus Pallas, 1778) nelle Zone di Ripopolamento e Cattura "Piani d'Erba", "Monte San Primo" e nell'Oasi di Protezione Faunistica "Parco Pineta" verificati mediante tecniche di radio-tracking.* Amm. Prov. di Como, Settore Risorse Ambientali, Servizio Faunistico: pp. 148.
- Wauters L. A., Gurnell J., Preatoni D., Tosi G., 2001a.** *Effects of spatial variation in food availability on spacing behaviour and demography of Eurasian red squirrels.* Ecography, 24.
- Wauters L. A., Gurnell J., Martinoli A., Tosi G., 2001b.** *Does interspecific competition with introduced grey squirrels affect foraging and food choice of Eurasian red squirrels?* Anim. Behav., 61: 1079-1091.
- Weber M., 1928.** *Die Saugetiere.* II ed., Vol.II, G. Fischer, Jena.
- Weber J. M., Meia J. S., 1996.** *Habitat use by the red fox Vulpes vulpes in a mountainous area.* Ethology Ecology & Evolution, 8: 223-232.
- Weber J. M., Aubry S., Lachat N., Meia J. S., Mermod C., Paratte A., 1991.** *Fluctuation and behaviour of foxes determined by nightlighting. Preliminary results.* Acta Theriologica, 36(3-4): 285-291.
- Webster P., Frandsen F., 1994.** *Prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in Danish deer.* Acta Pathologica Microbiologica et Immunologica Scandinavica, 102: 287-290.
- Wesolowski T., Tomialojc L., 1986.** *The breeding ecology of woodpeckers in a temperate primaevai forest: preliminary data.* Acta ornithologica, 22: 1-21.
- Whiting J. M., Dixon J. R., Greene B. D., 1995.** *Measuring snake activity patterns: the influence of habitat heterogeneity on catchability.* Amphibia-Reptilia, 17: 47-54.
- Wimsatt W. A., Trapido H., 1952.** *Reproduction and the female reproductive cycle in the tropical American Vampire Bat, Desmodus rotundus murinus.* Amer. J. Anat., XCI (3): 415-446.
- Witzig A., 1963.** *Caprioli al Monte Generoso.* Nostro Paese, 12(52): 1058-1059.
- Zielinski J. F., Kucera T. E., 1996.** *American marten, fisher, lynx and wolverine: survery methods for their detencion.* United States Department of Agriculture. Forest Service. U.S. Government. printing office: 163+.

-
- Zilio A., 1996.** *Documento orientativo per la gestione dei Comprensori Alpini di Caccia e degli Ambiti Territoriali di Caccia.* Provincia di Varese, Servizio Socio Ricreativo, Sezione Caccia e Pesca, Varese.
- Zuffi M., 1984.** *Cenni sulla distribuzione dell'ofidiofauna in un ambiente tipo dell'Appennino pavese: fasce preferenziali e loro condizioni ecologiche.* *Natura*, Milano, 75(1-4): 65-68.
- Zuffi M., 1987.** *Anfibi e Rettili del Parco lombardo della Valle del Ticino: risultati preliminari e proposte gestionali.* Quaderni della Civica Stazione Idrobiologica di Milano, 14: 7-65.
- Zuffi M., Ferri V., 1990.** *Guide di sistematica del Museo di Storia Naturale di Milano. Anfibi della Fauna Italiana. Urodeli.* *Natura*, Milano, 81(2-3): 1-48.